

Dr Nathaniel KHALIFA
CONSENTEMENT ECLAIRE
INJECTIONS D'ACIDE HYALURONIQUE

• **Indication :**

Les produits de comblements sont des implants injectables biodégradables à base d'acide hyaluronique réticulé d'origine non animale et pour certains à base de lidocaïne, utilisés dans les traitements esthétique du visage tels que la correction des lignes et des rides, l'augmentation du volume des lèvres et la correction des contours. La présence de lidocaïne vise à réduire la sensation douloureuse. Le choix du type d'acide hyaluronique par votre médecin dépend de l'épaisseur de la peau, de la profondeur de la ride, de l'existence ou non d'une perte de volume au niveau des pommettes et des joues notamment.

• **Résultat :**

La tenue dans le temps de ce type de traitement est de 12 mois dans le traitement des lèvres, sillons de la zone péri-buccale, des rides du lion, de la zone péri-orbitaire. Elle est de 12 à 18 mois quand on utilise un acide hyaluronique volumateur pour la zone des pommettes ou des joues. Ces durées sont données à titre indicatif et varie en fonction du type de peau, de l'hygiène de vie (tabac, exposition solaire, stress...). Une séance annuelle est recommandée pour l'entretien du résultat.

• **Effets indésirables :**

Il existe des effets secondaires potentiels liés à l'injection du gel d'acide hyaluronique survenant immédiatement ou de façon retardée. Parmi ceux-ci :

- Douleur à l'injection, rougeur, œdèmes, démangeaisons, ecchymose aux points d'injection. Ces réactions peuvent disparaître entre 18H et 8 jours. Un maquillage correcteur de teint est tout à fait possible.
- De rares cas de coloration ou de dépigmentation de la zone injectée ont été rapportés.

Toute réaction anormale est à signaler à votre médecin dans les plus brefs délais

• **Information sur les risques potentiels :**

Des réactions infectieuses, des hématomes, indurations ou nodules peuvent apparaître au point d'injection.

De rares cas de nécroses dans la région de la glabelle, d'abcès, de granulomes d'hypersensibilité ont été rapportés après des injections d'acide hyaluronique et/ou de lidocaïne.

• **Précaution pré et post injections :**

La prise d'aspirine et de vitamine C à dose élevée est à éviter la semaine précédant l'injection.

Éviter l'exposition prolongée au soleil, aux UV, aux températures inférieures à 0°C, ainsi que la pratique du sauna ou hammam pendant les deux semaines suivant l'injection.

Éviter de frotter ou masser les zones traitées pendant 24 heures suivant le traitement.

Éviter de se maquiller durant les 12 heures suivant le traitement.

• **Contre-indications :** *Il est important de signaler à votre médecin vos antécédents médicaux et esthétiques*

- Grossesse et allaitement, chez l'enfant
- Allergie à l'acide hyaluronique ou aux anesthésiques locaux
- Patients atteints de porphyrie, d'épilepsie non contrôlée
- Patients atteints d'hépatite C traitées par interférons

➤ **Des précautions d'emploi ou contre-indications seront observées en cas de:**

- Maladies auto-immunes (la contre-indication est formelle en cas de maladie évolutive et/ou non traitée), de traitement immuno-suppresseur
- Inflammation ou d'infection évolutive aux points d'injection (acné, herpes...)
- Antécédents d'injections de produits d'injections non résorbables
- Patients ayant tendance à développer des cicatrices hypertrophiques

Pas d'utilisation en association IMMEDIATE avec un traitement au laser, un peeling profond ou dermabrasion.

Je soussigné(e) :certifie que le Docteur Nathaniel KHALIFA m'a exposé tous les risques connus inhérents à ce geste. Je reconnais avoir pu lui poser toutes les questions concernant cette intervention et que les explications ont été claires et compréhensives. Je donne mon consentement libre et éclairé à l'acte mentionné ci-dessus, en toute connaissance de cause.

Fait à Montauban en double exemplaires originaux le

Signature (mention « lu et approuvé »